

INSTRUKCJA DO PREZENTU · EDYCJA POLSKA

Model punktów akupunktury ciała konia

Pełne tłumaczenie karty punktów akupunktury weterynaryjnej
dołączonej do modelu — oryginał w języku chińskim, punkty 1–
109.

Przetłumaczone specjalnie dla Ciebie, żeby teoria z książki
„Metoda Mastersona” miała od razu gdzie wylądować.

Sto lat, Kamila – Marta i Mateusz

Spis treści

1. Str. 1 — Głowa i szyja: punkty 1–6 (czubek głowy, czoło, oczy)
2. Str. 2 — Głowa i szyja: punkty 7–12 (okolica oczu)
3. Str. 3 — Głowa i szyja: punkty 13–18 (okolica nosa)
4. Str. 4 — Głowa i szyja: punkty 19–24 (wargi, pysk)
5. Str. 5 — Głowa i szyja: punkty 25–31 (policzek, uszy, kark)
6. Str. 6 — Głowa i szyja / Kończyna przednia: punkty 32–36
7. Str. 7 — Kończyna przednia: punkty 37–42 (bark, ramię)
8. Str. 8 — Kończyna przednia: punkty 43–48 (bark, łokieć, przedramię)
9. Str. 9 — Kończyna przednia: punkty 49–53 (przedramię, pacha)
10. Str. 10 — Kończyna przednia: punkty 54–59 (śródręcze, pęcina, kopyto)
11. Str. 11 — Tułów boczny (klatka piersiowa/brzuch): punkty 60–66
12. Str. 12 — Tułów boczny: punkty 67–72
13. Str. 13 — Tułów boczny / Lędźwie i zad: punkty 73–79
14. Str. 14 — Lędźwie i zad / Kończyna tylna: punkty 80–84
15. Str. 15 — Kończyna tylna: punkty 85–90 (biodro, udo)
16. Str. 16 — Kończyna tylna: punkty 91–97 (udo, kolano)
17. Str. 17 — Kończyna tylna: punkty 98–103 (kolano, podudzie)
18. Str. 18 — Kończyna tylna: punkty 104–109 (staw skokowy, pęcina, kopyto)
19. Uwagi, objaśnienie jednostek i terminów

Region: Głowa i szyja

| NR | NAZWA PUNKTU | LOKALIZACJA PUNKTU | METODA NAKŁĘWANIA / KAUTERYZACJI | ODCZUCIE PO NAKŁĘCIU | WSKAZANIA (LECZY) |
|----|--------------------------------------|--|--|--|---|
| 1 | Da Feng Men — „Wielka Wrota Wiatru” | Na szczycie głowy, w centrum przed podstawą grzywy, w miejscu rozwidlenia grzebienia strzałkowego kości ciemieniowej – jeden punkt. | Nowa igła wprowadzana płytko, poziomo, w kierunku prosto do dołu, na głębokość 2–3 cun. | Oba uszy prostują się i kierują do tyłu. | Tężec, zapalenie mózgu, zapalenie mózgowo-rdzeniowych opon mózgowych, obrzęk mózgu. |
| 2 | Tong Tian — „Sięgający Nieba” | Na środku czoła, w punkcie środkowym linii łączącej centralne punkty obu oczodołów – jeden punkt. | Moksoterapia (przypalanie piołunem) lub kauteryzacja (przypalanie). | — | Ropienie zatoki czołowej, przekrwienie mózgu. |
| 3 | Long Hui — „Zgromadzenie Smoka” | W punkcie środkowym linii łączącej zewnętrzne kąćki obu oczu – jeden punkt. | Jak wyżej (moksoterapia lub kauteryzacja). | — | Przekrwienie mózgu, niedokrwienie mózgu, reumatyzm karku. |
| 4 | Tong Tang — „Sięgająca Sala” | W punkcie środkowym linii łączącej wewnętrzne kąćki obu oczu – jeden punkt. | Jak wyżej (moksoterapia lub kauteryzacja). | — | Takie same wskazania jak dla punktu Long Hui. |
| 5 | Shang Guan — „Górna Brama” | Powyżej stawu żuchwowego, we wgłębieniu pod dolnym brzegiem łuku jarzmowego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wprowadza się w kierunku do dołu na głębokość 0,8–1 cun. | Głowa kołysze się/potrząsa, drgania nosa i warg. | Tężec, porażenie nerwu twarzowego. |
| 6 | Xia Guan — „Dolna Brama” | Poniżej stawu żuchwowego, jeden cun przed i pod punktem Shang Guan. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wprowadza się w kierunku do góry na głębokość 1,5–2 cun. | Takie samo jak dla punktu Shang Guan. | Takie same wskazania jak dla punktu Shang Guan. |
| 7 | Yan Mai — „Naczynie Oka” | Na naczyniu krwionośnym, 5 fen w tył od punktu Taiyang. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Taiyang. | — | Takie same wskazania jak dla punktu Taiyang. |
| 8 | Tai Yang — „Słońce” | Na żyłę poprzeczną twarzy, 1 cun w tył i w dół od zewnętrznego kąćka oka. Po jednym punkcie z każdej strony. | Małą szeroką igłą wkłuć wzdłuż naczynia na głębokość 2–3 fen. Powoduje krwawienie. | — | Zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, okresowe (nawracające) zapalenie oka, udar ciepłny. |
| 9 | Zhuan Nao — „Obracający Mózg” | Powyżej zewnętrznego kąćka oka, na fałdzie skórny powieki wzdłuż dolnego brzegu wyrostka nadoczodołowego. Po jednym punkcie przy każdym oku. | Docisnąć gałkę oczną w dół. Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkłuć wzdłuż dolnego brzegu wyrostka nadoczodołowego na głębokość 2–2,5 cun. | Takie samo jak przy punkcie Jing Ming. | Takie same wskazania jak przy punkcie Jing Ming. |
| 10 | Jing Yu | Na dolnym brzegu wyrostka nadoczodołowego, na środku górnej powieki. Po jednym punkcie przy każdym oku. | Docisnąć gałkę oczną w dół. Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkłuć wzdłuż dolnego brzegu wyrostka nadoczodołowego na głębokość 2–2,5 cun. | Takie samo jak przy punkcie Jing Ming. | Takie same wskazania jak przy punkcie Jing Ming. |
| 11 | Kai Guan — „Otwierająca Brama” (oko) | Na granicy dolnego brzegu rogówki z twardówką, w części środkowej. Po jednym punkcie przy każdym oku. | Gdy pasożyt (larwa) przemieści się do przedniej komory oka: zwiększyć znieczuleniem miejscowym, otworzyć powiekę i unieruchomić gałkę oczną, delikatnie i szybko wkłuć cienką igłą trójkątną lub igłą okulistyczną na głębokość 1 fen i natychmiast wyjąć igłę, aby pasożyt wypłynął wraz z płynem komory oka. | — | Choroba pasożytnicza oka (zaćmienie/zmętnienie rogówki wywołane przez larwy nicieni – tzw. „hunjing chongbing”). |
| 12 | Jing Ming — „Jasność Oka” | Wewnątrz dolnej powieki, na górnym brzegu kości łzowej, w miejscu granicy środkowej 1/3 długości powieki. Po jednym punkcie przy każdym oku. | Docisnąć gałkę oczną do góry. Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkłuć wzdłuż górnego brzegu kości łzowej na głębokość 2–2,5 cun. | Górna i dolna powieka stale się zamykają, łzawienie. | Zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, okresowe (nawracające) zapalenie oka, bielmo rogówki. |
| 13 | San Jiang — „Trzy Rzeki” | Na żyłę kąćka oka, około 1 cun poniżej wewnętrznego kąćka oka. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą trójkątną wkłuć wzdłuż naczynia, od dołu do góry, na głębokość 2–3 fen. Powoduje krwawienie. | — | Skurcz jelit, wzdęcie jelit, zaparcie, niestrawność; zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, okresowe (nawracające) zapalenie oka. |
| 14 | Da Mai — „Wielkie Naczynie” | Na żyłę, około 7 fen w przód i w dół od punktu San Jiang. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie San Jiang. | — | Takie same wskazania jak dla punktu San Jiang. |
| 15 | Xue Tang — „Sala Krwi” | Po obu stronach grzbietu nosa, 2 cun od górnego brzegu nozdrzy. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą trójkątną wkłuć poziomo z jednej strony, przebijając przegrodę nosową na wyłot. Powoduje krwawienie. | — | Nieżyt nosa (zapalenie błony śluzowej nosa), przemęczenie, przekrwienie mózgu, przekrwienie płuc. |
| 16 | Bi Yu | 1 cun poniżej punktu Xue Tang. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Xue Tang. | — | Takie same wskazania jak dla punktu Xue Tang. |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--|--|
| 17 | Chou Jin — „Ściągnięcie Ściągną” | Między wgłębieniami po wewnętrznej stronie obu nozdrzy — jeden punkt. | Naciąć skórę wzdłuż punktu na długość około 4–5 fen, wyciągnąć hakiem ściętno mięśnia unoszącego wargę górną, wielokrotnie energicznie pociągać. | — | Reumatyzm okolicy szyi. |
| 18 | Fen Shui — „Rozdzielające Wody” | Na zewnętrznej stronie wargi górnej, w miejscu centralnego wiru włosowego — jeden punkt. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 1–1,5 cun. | Wyraźne skurczenie wargi górnej, poruszanie się na boki. | Skurcz jelit, wzdęcie jelit, zaparcie, rozstrzeń żołądka, niestrawność. |
| 19 | Jiang Wen — „Obniżająca Temperaturę” | Na zewnętrznej stronie wargi górnej, na linii łączącej dolne brzegi obu nozdrzy, 3 fen na boki od wewnętrznego skrzydełka nosa. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 3–5 fen. | Wyraźne skurczenie wargi górnej. | Przeziębienie, wysoka gorączka, udar ciepły, przemęczenie. |
| 20 | Wai Chun — „Zewnętrzna Warga” | Na zewnętrznej stronie wargi górnej, dokładnie pośrodku między dolnymi brzegami obu nozdrzy. | Igłą średnio-szeroką wkluć pionowo na głębokość 3 fen. | — | Zapalenie jamy ustnej, niestrawność, zapalenie gardła. |
| 21 | Nei Chun — „Wewnętrzna Warga” | Po wewnętrznej stronie wargi górnej, 1 cun od dziąsła, około 5–8 fen na boki od wędzidełka wargi górnej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą trójkątną wkluć na głębokość 3 fen. | — | Zapalenie jamy ustnej, niestrawność, zapalenie gardła. |
| 22 | Jiang Ya — „Ząb Imbirowy” | Na szczycie chrząstki zewnętrznego skrzydełka nosa. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą trójkątną wkluć na głębokość 3 fen. | — | Skurcz jelit, zaparcie, rozstrzeń żołądka. |
| 23 | Suo Kou — „Zamykająca Usta” | 7 fen w tył i w górę od kącika ust, na zewnętrznym brzegu mięśnia okrężnego ust. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć w kierunku do tyłu i w górę na głębokość 2–3 cun. | Skurcz mięśni warg. | Tężec, porażenie nerwu twarzewego. |
| 24 | Kai Guan — „Otwierająca Brama” (żuchwa) | W miejscu przecięcia linii przedłużającej kącik ust do tyłu z przednim brzegiem mięśnia żwacza. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć w kierunku do tyłu i w górę na głębokość 3 cun, albo wkluć na wylot w kierunku do przodu i w dół, aż do punktu Suo Kou. | Wyraźne drżenie mięśnia żwacza i mięśnia mostkowo-głowego szyi; przy przekłuciu na wylot — drżenie mięśni warg i policzka. | Takie same wskazania jak dla punktu Suo Kou. |
| 25 | Bao Sai — „Obejmujący Policzek” | Około 2,5 cun poniżej grzebienia twarzewego, około 2 cun do tyłu od przedniego brzegu mięśnia żwacza. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu lub igłą ogniową wkluć skośnie w górę na głębokość 6–8 fen. | — | Obrzęk twarzy, osteomalacja (rozmiękanie kości), skurcz mięśnia żwacza. |
| 26 | Cheng Jiang — „Przyjmujący Ślinę” | Na środku wargi dolnej, około 1 cun od jej brzegu — jeden punkt. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć na głębokość około 3 fen. | — | Porażenie nerwu twarzewego, zapalenie jamy ustnej. |
| 27 | Yu Tang — „Nefrytowa Sala” | W jamie ustnej, na trzecim fałdzie podniebiennym górnej szczęki, 5 fen na bok od linii środkowej. | Igłą trójkątną wkluć od kącika ust skośnie w kierunku do przodu i w górę na głębokość 3 fen; po wystąpieniu krwawienia przetrzeć solą kuchenną. | — | Zapalenie jamy ustnej, niestrawność, udar ciepły, przemęczenie, przeziębienie. |
| 28 | Er Jian — „Czubek Ucha” | Na żyłe usznej po tylnej stronie czubka ucha, lub na samym wierzchołku czubka ucha. Po jednym punkcie z każdej strony. | Małą szeroką igłą wkluć w naczynie, powodując krwawienie, albo igłą trójkątną wkluć prostopadle na wierzchołku czubka ucha na głębokość 3–4 fen, powodując krwawienie. | — | Skurcz jelit, przeziębienie. |
| 29 | Ting Er — „Wyprostowujący Ucho” | Po wewnętrznej stronie nasady ucha, we wgłębieniu przed przednim brzegiem grzebienia potylicznego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu lub igłą ogniową wkluć podskórną na głębokość 1 cun. | — | Drętwienie jednego ucha, apatia (przycięcie), wyczerpanie. |
| 30 | Feng Men — „Wrota Wiatru” (kark) | 1 cun za uchem, około 2 cun od dolnego brzegu grzywy, we wgłębieniu przed przednim brzegiem skrzydła atlasu (pierwszego kręgu szyjnego). Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie prosto do góry na głębokość 2 cun. | Ucho po tej samej stronie prostuje się. | Zapalenie mózgu, przeziębienie, tężec. |
| 31 | Fu Tu — „Przyczajony Zając” | 2 cun za uchem, 1,5 cun od dolnego brzegu grzywy, we wgłębieniu przed przednim brzegiem skrzydła atlasu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Feng Men. | Tak samo jak w punkcie Feng Men. | Takie same wskazania jak dla punktu Feng Men. |
| 32 | Jiu Wei — „Dziewięć Punktów Wei” | Po obu stronach szyi, po dziewięć punktów każda. Pierwszy punkt (Yi Wei) leży ok. 2 cun w tył i w dół od punktu Feng Men, 1,2 cun od dolnego brzegu grzywy; dziewiąty punkt (Jiu Wei) leży ok. 1,5 cun przed przednim kątem łopatki (punkt Bo Jian), 1,8 cun od dolnego brzegu grzywy. Odcinek między punktem pierwszym a dziewiątym dzieli się na 8 równych części: Er Wei, San Wei, Si Wei, Wu Wei, Liu Wei, Qi Wei, Ba Wei. Punkty układają się łukowato wzdłuż dolnego brzegu mięśnia równoległobocznego. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 1,5–3 cun. | Skurcz mięśni szyi i okolicy łopatki, drżenie mięśni kłębów. | Reumatyzm szyi, tężec. |

| | | | | | |
|----|------------------------------|---|---|---|---|
| 33 | Jing Mai — „Naczynie Szyjne” | Na żyłę szyjnej, na granicy górnej i środkowej 1/3 jej długości. Po jednym punkcie z każdej strony. | Najpierw doprowadzić do wypełnienia (rozszerzenia) naczynia krwią, następnie dużą szeroką igłą lub igłą do upuszczania krwi wkuć wzdłuż naczynia, upuszczając krew. | — | Przemęczenie, udar cieplny, przekrwienie mózgu, przekrwienie płuc, ochwat kopyt, zapalenie jamy ustnej. |
|----|------------------------------|---|---|---|---|

Region: Kończyna przednia

| NR | NAZWA PUNKTU | LOKALIZACJA PUNKTU | METODA NAKŁUWANIA / KAUTERYZACJI | ODCZUCIE PO NAKŁUCIU | WSKAZANIA (LECZY) |
|----|---|---|--|---|--|
| 34 | Bo Jian — „Czubek Łopatki” | We wgłębieniu w miejscu połączenia chrząstki łopatkowej z przednim kątem łopatki. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć wzdłuż wewnętrznego brzegu łopatki, lekko w kierunku do tyłu i w dół, na głębokość 3–4 cun. | Drżenie mięśni kłębu. | Porażenie nerwu nadłopatkowego, zapalenie stawów, reumatyzm kończyny przedniej. |
| 35 | Fei Men — „Brama Ptuc” | Na przednim brzegu łopatki, na środku podstawy szyi, 4 cun w przód i w dół od punktu Bo Jian. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć wzdłuż wewnętrznego brzegu łopatki w kierunku do tyłu i w dół, na głębokość 3–4 cun. | Drżenie mięśni okolicy łopatki. | (brak czytelnych danych w oryginale na tej stronie — patrz wskazania punktu sąsiedniego Bo Zhong) |
| 36 | Bo Zhong — „Środek Łopatki” | Na przednim brzegu łopatki, 2 cun poniżej punktu Fei Men. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć wzdłuż wewnętrznego brzegu łopatki, skośnie w kierunku do tyłu i do wewnątrz, na głębokość 2,5–3 cun. | Drżenie mięśni okolicy łopatki i łokcia. | Reumatyzm kończyny przedniej, zapalenie stawu barkowego i łokciowego, porażenie nerwu nadłopatkowego, zapalenie mięśnia mostkowo-ramiennogłowego. |
| 37 | Jian Jing — „Studnia Barkowa” | Na końcu barku, we wgłębieniu na zewnętrznym górnym brzegu guzka większego kości ramiennej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć w kierunku do tyłu i w dół na głębokość 2–2,5 cun. | Uniesienie tej kończyny. | Reumatyzm kończyny przedniej, zapalenie stawu barkowego, zapalenie mięśnia mostkowo-ramiennogłowego, porażenie nerwu nadłopatkowego. |
| 38 | Gong Zi — „Łuk” | Bezpośrednio pod środkowym punktem górnego brzegu chrząstki łopatkowej, 3 cun w dół. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie w dół na głębokość 4–5 cun. | Tak samo jak w punkcie Fei Pan. | Porażenie nerwu nadłopatkowego, zanik mięśni barku i ramienia, przewlekła kulawizna barkowa. |
| 39 | Bo Lan — „Zagroda Łopatki” | We wgłębieniu w miejscu połączenia chrząstki łopatkowej z tylnym kątem łopatki. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć wzdłuż wewnętrznego brzegu łopatki w kierunku do przodu i do wewnątrz, na głębokość 3–4 cun. | Tak samo jak w punkcie Bo Jian. | Takie same wskazania jak dla punktu Bo Jian. |
| 40 | Fei Pan — „Wspinający się do Ptuc” | Na tylnym brzegu łopatki, 4 cun w przód i w dół od punktu Bo Lan. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć wzdłuż wewnętrznego brzegu łopatki w kierunku końca barku po tej samej stronie, na głębokość 2,5–3 cun. | Drżenie mięśni okolicy łopatki. | Porażenie nerwu nadłopatkowego, zapalenie mięśnia mostkowo-ramiennogłowego, reumatyzm kończyny przedniej. |
| 41 | Chong Tian — „Wznoszący się do Nieba” | W bruździe mięśniowej, 3 cun w tył i w górę od punktu Qiang Feng. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 3–3,5 cun. | Uniesienie tej kończyny, skurcz mięśni okolicy łopatki. | Takie same wskazania jak dla punktu Qiang Feng. |
| 42 | Lun Feng — „Koło Wiatru” | Z tyłu kości ramiennej, we wgłębieniu między głową długą a głową boczną mięśnia trójgłowego ramienia, za tylnym brzegiem mięśnia naramiennego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 2,5–3 cun. | Wyraźny skurcz mięśni tej okolicy, uniesienie kończyny. | Zapalenie stawów różnych części kończyny przedniej, zapalenie mięśnia mostkowo-ramiennogłowego, porażenie nerwu promieniowego, reumatyzm kończyny przedniej. |
| 43 | Jian Wai* — „Boczne Wgłębienie Barkowe” | We wgłębieniu na tylnym brzegu guzka większego kości ramiennej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć przy tylnym brzegu kości ramiennej, prostopadle, na głębokość 2,5–3 cun. | Tak samo jak w punkcie Jian Chan. | Takie same wskazania jak dla punktu Jian Chan. |
| 44 | Jian Chan* — „Drżenie Barku” | Na końcu barku, we wgłębieniu na dolnym brzegu guzka większego kości ramiennej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć wzdłuż przedniego brzegu kości ramiennej w kierunku do wewnątrz i w górę, na głębokość 1 cun. | Skurcz mięśni wokół łopatki. | Zapalenie stawu barkowego, zapalenie mięśnia mostkowo-ramiennogłowego, porażenie nerwu promieniowego. |
| 45 | Yan Zhou — „Oslaniający Łokieć” | W linii łokcia, we wgłębieniu ok. 1,5 cun w tył i w dół od wyrostka łokciowego kości łokciowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie do przodu i lekko w dół, na głębokość 8 fen – 1 cun. | Drżenie mięśni wokół łokcia. | Reumatyzm mięśni okolicy łokcia. |
| 46 | Cheng Deng — „Dosiadający Strzemię” | We wgłębieniu ok. 1,3 cun w tył i w dół od wewnętrznej strony wyrostka łokciowego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie do przodu i w górę, na głębokość 8 fen – 1 cun. | Tak samo jak w punkcie Yan Zhou. | Takie same wskazania jak dla punktu Yan Zhou. |
| 47 | Zhou Yu | We wgłębieniu bezpośrednio przed końcem łokcia. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 1,5 cun. | Drżenie mięśni okolicy łokcia. | Zapalenie stawu łokciowego. |

| | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|
| 48 | Cheng Zhong — „Dźwigający Ciężar” | Na zewnętrznej stronie przedramienia, we wgłębieniu poniżej guzka więzadłowego na zewnętrznej górnej części kości promieniowej, w bruzdzie mięśnia prostownika wspólnego palców. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkuć lekko skośnie do przodu na głębokość 1,5–2 cun. | Uniesienie tej kończyny. | Reumatyzm kończyny przedniej, zapalenie stawu łokciowego, porażenie nerwu promieniowego, zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie pochewki ścięgnowej. |
| 49 | Qian San Li — „Przednie Trzy Li” | 2 cun w przód i w dół od punktu Cheng Zhong, w bruzdzie mięśniowej między mięśniem prostownikiem nadgarstka a mięśniem prostownikiem wspólnym palców. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadłe na głębokość 1–1,5 cun. | Tak samo jak w punkcie Cheng Zhong (uniesienie kończyny). | Oprócz takich samych wskazań jak przy punkcie Cheng Zhong, dodatkowo: zapalenie stawu pięcynowego, tężec. |
| 50 | Guo Liang — „Przechodzący przez Belkę” | 1 cun powyżej zewnętrznej strony stawu nadgarstkowego, we wgłębieniu między tylnym brzegiem kości promieniowej a zewnętrznym mięśniem zginaczem nadgarstka. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkuć na wylot, od zewnątrz do wewnątrz. | Skurcz mięśni okolicy łokcia, uniesienie kończyny. | Zapalenie stawu nadgarstkowego. |
| 51 | Xiong Tang — „Sala Piersiowa” | Na żyłę podskórnej ramienia, blisko górnej części przedramienia, poniżej bruzdy bocznej klatki piersiowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Dużą szeroką igłą szybko wkuć na głębokość 3 fen, powodując krwawienie. | — | Ostre zapalenie stawu barkowego i łokciowego, zapalenie mięśnia mostkowo-ramiennie-głowowego, ochwat kopyt, reumatyzm barku i ramienia. |
| 52 | Jia Qi — „Ściskające Qi” | W okolicy pachy, na środku wewnętrznej strony górnej części przedramienia, w bruzdzie mięśniowej łączącej się z tułowiem. Po jednym punkcie z każdej strony. | Unieść chorą kończynę, pociągnąć ją do przodu i na zewnątrz. Naciąć skórę wzdłuż punktu, przez nacięcie wprowadzić specjalną igłą „jiaqi” w kierunku do tyłu, w górę i na zewnątrz (w stronę punktu Qiang Feng) na głębokość 7–8 cun, wyjąć igłę, następnie kilkakrotnie poruszyć chorą kończyną w przód i w tył. Podczas zabiegu obowiązuje ścisła aseptyka/dezynfekcja. | — | Przewlekła kulawizna barkowa, porażenie nerwu łopatkowego. |
| 53 | Tong Jin — „Wspólne Ściągno” | 2 cun poniżej punktu Jia Qi, na żyłę podskórnej przedramienia. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Małą szeroką igłą wkuć na głębokość 3 fen, powodując krwawienie. | — | Takie same wskazania jak dla punktu Xiong Tang. |
| 54 | Nian Jin — „Chwytające Ściągno” | Na zewnętrznej stronie górnej części śródreżca, 2 cun od dolnego brzegu stawu nadgarstkowego, na żyłę bocznej linii środkowej dłoni, na przednio-zewnętrznym brzegu ścięgna głębokiego zginacza palców. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Małą szeroką igłą wkuć na głębokość 3 fen, powodując krwawienie. | — | Zapalenie stawu nadgarstkowego, guz kości śródreżca (stadium początkowe), zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie ścięgien, zapalenie stawu pięcynowego. |
| 55 | Qian Chan Wan — „Przednie Owinięcie Nadgarstka” | Na górnym brzegu stawu pięcynowego, na żyłach palcowych po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Po jednym punkcie po każdej stronie (wewnętrznej i zewnętrznej) każdej kończyny. | Małą szeroką igłą wkuć na głębokość 2–3 fen, powodując krwawienie. | — | Skręcenie stawu pięcynowego, zapalenie stawu pięcynowego, ostre zapalenie stawu nadgarstkowego, zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie pochewki ścięgnowej. |
| 56 | Ming Tang — „Jasna Sala” | Na zewnętrznej, tylny-dolnej części stawu pięcynowego, we wgłębieniu bezpośrednio pod kością trzeszczkową. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Małą szeroką igłą wkuć w kierunku do góry na głębokość 3–4 fen. | — | Skręcenie stawu pięcynowego, zapalenie ścięgna zginacza, zapalenie pochewki ścięgnowej. |
| 57 | Qian Jiu — „Przednia Panewka” | Na środku tylnej części kopyta, we wgłębieniu powyżej opuszki kopyta. Po jednym punkcie w każdym kopycie. | Unieruchomić, unosząc kończynę. Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkuć w kierunku czubka kopyta, na głębokość 1–1,5 cun. | Uniesienie kończyny. | Zapalenie stawu pięcynowego, ochwat kopyt, zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie stawu nadgarstkowego, reumatyzm kończyny przedniej. |
| 58 | Qian Ti Men — „Przednia Brama Kopyta” | Na górnym brzegu opuszki kopyta, we wgłębieniu na tylnym końcu chrząstki kopytowej. Po jednym punkcie po wewnętrznej i zewnętrznej stronie każdego kopyta. | Małą szeroką igłą wkuć na głębokość 3 fen. | — | Zapalenie opuszki kopyta i schorzenia pokrewne. |
| 59 | Qian Ti Tou — „Przednia Głowa Kopyta” | Na górnym brzegu koronki kopyta, na środku, 7–8 fen na zewnątrz od linii środkowej. Po jednym punkcie w każdym kopycie. | Dużą szeroką igłą szybko wkuć na głębokość 3 fen, powodując krwawienie. | — | Ochwat kopyt, zapalenie opuszki kopyta, kolka (ból brzucha). |

* Nazwy punktów 43 i 44 były trudne do jednoznacznego odczytania na zdjęciu oryginału – podano najbardziej prawdopodobne brzmienie.

Region: Tułów boczny (klatka piersiowa i brzuch)

| NR | NAZWA PUNKTU | LOKALIZACJA PUNKTU | METODA NAKŁUWANIA / KAUTERYZACJI | ODCZUCIE PO NAKŁUCIU | WSKAZANIA (LECY) |
|----|--------------------------------|---|---|--|---|
| 60 | Du Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 10. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie w kierunku do wewnątrz i w dół na głębokość 1–1,3 cun. | Drżenie mięśni międzyżebrowych. | Skurcz jelit, przemęczenie. |
| 61 | Fei Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 9. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Zapalenie opłucnej, zapalenie oskrzeli, zapalenie płuc. |
| 62 | Ge Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 8. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Zapalenie żołądka i jelit, przewlekłe zaparcia, zapalenie tchawicy. |
| 63 | Dan Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 7. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Zaparcie jelit, żółtaczką, gorączka, dreszcze, zapalenie gardła. |
| 64 | Wei Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 6. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Niestrawność, skurcz jelit, wzdęcie jelit, rozstrzeń żołądka. |
| 65 | Gan Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 5. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Zapalenie spojówek, zapalenie rogówki, niestrawność. |
| 66 | San Jiao Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 4. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Niestrawność, skurcz jelit. |
| 67 | Pi Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 3. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Niestrawność, skurcz jelit, wzdęcie jelit, rozstrzeń żołądka. |
| 68 | Qi Hai Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 2. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Tak samo jak w punkcie Du Yu. | Rozstrzeń żołądka. |
| 69 | Da Chang Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, w 1. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie w kierunku do wewnątrz i w dół na głębokość 1,2–1,5 cun. | Tak samo jak w punktach powyższych. | Niestrawność, wzdęcie jelit, zapalenie jelit, zaparcie jelit. |
| 70 | Guan Yuan Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, wzdłuż tylnego brzegu 18. żebra. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 2–2,5 cun. Elektroakupunktura daje lepsze efekty terapeutyczne. | Podczas elektroakupunktury: skurcz mięśni brzucha, wzmożona perystaltyka jelit, oddawanie gazów, wypróżnienie. | Zaparcie jelit, niestrawność, skurcz jelit, wzdęcie jelit, rozstrzeń żołądka. |
| 71 | Xiao Chang Yu | W bruzdzie mięśnia biodrowo-żebrowego, około 1 cun w tył od punktu Guan Yuan Yu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie w kierunku do wewnątrz i w dół na głębokość 1,2–1,5 cun. | Skurcz mięśni jelit. | Takie same wskazania jak dla punktu Guan Yuan Yu. |
| 72 | Duan Xue — „Przecinający Krew” | Na linii środkowej grzbietu, we wgłębieniach między wyrostkami kolczystymi: 17.–18. kręgu piersiowego, 18. kręgu piersiowego – 1. kręgu lędźwiowego, oraz 1.–2. kręgu lędźwiowego. Łącznie trzy punkty. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 8 fen – 1 cun. | Drżenie mięśni międzyżebrowych. | Krwawienie po zabiegu kastracji, krwawienie z nosa, krwimocz, krew w kale. |
| 73 | Jue Yin Yu | W 12. przestrzeni międzyżebrowej licząc od tyłu, około 6,3 cun od linii środkowej grzbietu, we wgłębieniu na zewnętrznym dolnym brzegu mięśnia biodrowo-żebrowego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Igłą o zaokrąglonym ostrzu wkluć skośnie w kierunku do wewnątrz i w dół na głębokość 1 cun. | Drżenie mięśni międzyżebrowych. | Udar ciepły, skurcz jelit, nadmierne pocenie się. |
| 74 | Dai Mai — „Naczynie Pasa” | Na żyłę zewnętrznej klatki piersiowej, około 2 cun za wyrostkiem łokciowym. Po jednym punkcie z każdej strony. | Dużą szeroką igłą wkluć na głębokość 3 fen, powodując krwawienie. | — | Zapalenie jelit, skurcz jelit, udar ciepły. |

Region: Lędźwie i zad

| NR | NAZWA PUNKTU | LOKALIZACJA PUNKTU | METODA NAKŁUWANIA / KAUTERYZACJI | ODCZUCIE PO NAKŁUCIU | WSKAZANIA (LECZY) |
|----|----------------------------------|---|---|---|--|
| 75 | Yao Qian — „Przed Lędźwiami” | 2 cun przed punktem Yao Zhong. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Yao Hou. | Tak samo jak w punkcie Shen Yu. | Takie same wskazania jak dla punktu Yao Hou. |
| 76 | Yao Zhong — „Środek Lędźwi” | 2 cun przed punktem Yao Hou. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak wyżej. | Tak samo jak wyżej. | Tak samo jak wyżej. |
| 77 | Yao Hou — „Za Lędźwiami” | 2 cun przed punktem Shen Peng. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkluć w kierunku do wewnątrz i w dół na głębokość 2–2,5 cun. | Tak samo jak w punkcie Shen Yu. | Reumatyzm lędźwi, niedowład (osłabienie) lędźwi. |
| 78 | Shen Peng — „Półka Nerkowa” | 2 cun przed punktem Shen Yu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Shen Yu. | Tak samo jak w punkcie Shen Yu. | Takie same wskazania jak dla punktu Shen Yu. |
| 79 | Shen Yu | 2 cun na bok od punktu Bai Hui. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 1,5–2 cun. | Skurcz mięśni okolicy lędźwiowo-pośladkowej (zadu). | Reumatyzm tylnej części ciała, porażenie tylnej części ciała, niedowład lędźwi. |
| 80 | Shen Jiao — „Róg Nerkowy” | 2 cun za punktem Shen Yu. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Shen Yu. | Tak samo jak w punkcie Shen Yu. | Takie same wskazania jak dla punktu Shen Yu. |
| 81 | Bai Hui — „Sto Zgromadzeń” | W miejscu skrzyżowania lędźwiowo-krzyżowego, we wgłębieniu między wyrostkiem kolczystym ostatniego kręgu lędźwiowego a wyrostkiem kolczystym pierwszego kręgu krzyżowego — jeden punkt. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 3–3,5 cun. | Wygięcie grzbietu (lędźwi) w łuk, drżenie mięśni okolicy lędźwiowo-pośladkowej. | Reumatyzm tylnej części ciała, zapalenie stawu biodrowego, porażenie tylnej części ciała, przeziębienie, udar ciepły, przemęczenie, tężec, różne rodzaje kolkii. |
| 82 | Ba Liao — „Osieć Otworów” | Po obu stronach, między poszczególnymi wyrostkami kolczystymi kręgów krzyżowych, około 1,5 cun od linii środkowej grzbietu. Po cztery punkty z każdej strony, nazwane od przodu: Yi Liao, Er Liao, San Liao, Si Liao. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 1–1,5 cun. | Drżenie mięśni pośladka (zadu). | Reumatyzm tylnej części ciała, niedowład lędźwi, porażenie łąki. |
| 83 | Tong Chang — „Przelotowe Jelito” | Poprowadzić linię poziomą od górnego kąta guza biodrowego do tylnego brzegu ostatniego żebra. Następnie od tylnego brzegu ostatniego żebra oraz od górnego kąta guza biodrowego poprowadzić po jednej linii pionowej do linii środkowej grzbietu. Punkt leży w środku odcinka między tymi liniami. Przedni punkt to Tong Chang 1, tylny — Tong Chang 2. Tak samo po obu stronach. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkluć prostopadle na głębokość 2–2,5 cun. | Drżenie mięśni okolicy pachwiny (boku brzucha) i mięśni międzyżebrowych. | Zaparcie jelit, wzdęcie jelit, skurcz jelit. |

Region: Kończyna tylna

| NR | NAZWA PUNKTU | LOKALIZACJA PUNKTU | METODA NAKŁUWANIA / KAUTERYZACJI | ODCZUCIE PO NAKŁUCIU | WSKAZANIA (LECZY) |
|----|---------------------------------------|--|--|---|---|
| 84 | Yan Chi — „Skrzydło Dzikiej Gęsi” | Linia pionowa od guza biodrowego do linii środkowej grzbietu; punkt na granicy środkowej i zewnętrznej 1/3 tej linii. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć w kierunku do tyłu, do wewnątrz i w dół, na głębokość 2,5 cun. | Drzenie mięśni okolicy lędźwiowo-pośladkowej. | Reumatyzm mięśni tylnej części ciała, zapalenie stawu biodrowego i kolanowego. |
| 85 | Dan Tian — „Pole Cynobru” | We wgłębieniu w tylną-dolną część guza biodrowego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadle na głębokość 2,5–3,5 cun. | Tak samo jak w punkcie Yan Chi. | Takie same wskazania jak dla punktu Yan Chi. |
| 86 | Ba Shan — „Trzymająca się Góry” | W środkowym punkcie linii łączącej punkt Bai Hui z krętarzem większym kości udowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadle na głębokość 3–3,5 cun. | Skurcz mięśni pośladka (zadu). | Reumatyzm mięśni tylnej części ciała, zapalenie stawu biodrowego, zapalenie mięśnia dwugłowego uda, porażenie nerwu kulszowego. |
| 87 | Lu Gu — „Droga Uda” | Na granicy środkowej i dolnej 1/3 linii łączącej punkt Bai Hui z krętarzem większym kości udowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Ba Shan. | Tak samo jak w punkcie Ba Shan. | Takie same wskazania jak dla punktu Ba Shan. |
| 88 | Huan Tiao — „Skaczący Krąg” | We wgłębieniu na przednim brzegu stawu biodrowego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć skośnie w kierunku do tyłu, do wewnątrz i w dół, na głębokość 3,5–4 cun. | Skurcz mięśni pośladka, uniesienie kończyny. | Porażenie nerwu kulszowego, porażenie nerwu udowego, reumatyzm tylnej części ciała, zapalenie stawu biodrowego, zapalenie mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego, zapalenie mięśnia dwugłowego uda. |
| 89 | Da Kua — „Wielkie Biodro” | We wgłębieniu przednio-dolnym od krętarza większego kości udowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć wzdłuż przedniego brzegu kości udowej, skośnie w kierunku do przodu i do wewnątrz, na głębokość 2–3,5 cun. | Skurcz mięśni uda i pośladka. | Zapalenie stawu biodrowego, reumatyzm kończyny tylnej, porażenie nerwu udowego, porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego. |
| 90 | Xiao Kua — „Małe Biodro” | We wgłębieniu tylną-dolną od trzeciego krętarza kości udowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć wzdłuż tylnego brzegu kości udowej, lekko w kierunku do tyłu i w dół, na głębokość 2–3 cun. | Tak samo jak w punkcie Da Kua. | Reumatyzm kończyny tylnej, porażenie nerwu udowego oraz nerwu piszczelowego i strzałkowego, zapalenie mięśnia dwugłowego uda. |
| 91 | Xie Qi — „Patogenne Qi” | W bruzdzie mięśnia dwugłowego uda, około 3 cun na bok od nasady ogona. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadle na głębokość 2,5–3 cun. | Drzenie mięśni pośladka lub uda, poruszanie ogonem. | Reumatyzm mięśni uda i pośladka, zapalenie stawu biodrowego, zapalenie mięśnia dwugłowego uda, zapalenie mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego, porażenie nerwu kulszowego, porażenie nerwu udowego. |
| 92 | Han Gou — „Bruzda Potu” | W tej samej bruzdzie mięśniowej, 3 cun poniżej punktu Xie Qi. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak w punkcie Xie Qi. | Tak samo jak w punkcie Xie Qi. | Takie same wskazania jak dla punktu Xie Qi. |
| 93 | Yang Wa — „Odwrócona Dachówka” | W tej samej bruzdzie mięśniowej, 3 cun poniżej punktu Han Gou. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak wyżej. | Tak samo jak wyżej. | Tak samo jak wyżej. |
| 94 | Qian Shen — „Pociągający Nerwę” | W tej samej bruzdzie mięśniowej, 3 cun poniżej punktu Yang Wa. Po jednym punkcie z każdej strony. | Tak samo jak wyżej. | Tak samo jak wyżej. | Tak samo jak wyżej. |
| 95 | Hou Fu Tu — „Tylny Przyczajony Zając” | W środkowym punkcie linii łączącej krętarz większy kości udowej z rzepką. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadle na głębokość 1,5–2 cun. | Skurcz mięśni uda. | Reumatyzm kończyny tylnej, zapalenie stawu biodrowego i kolanowego. |
| 96 | Yin Shi — „Rynek Yin” | We wgłębieniu na górnym brzegu rzepki. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć w kierunku do wewnątrz i w dół na głębokość 1–1,2 cun. | Skurcz otaczających mięśni, uniesienie kończyny. | Zapalenie stawu kolanowego, reumatyzm kończyny tylnej. |
| 97 | Lüe Cao — „Muskająca Trawę” | We wgłębieniu poniżej rzepki, między więzadłem prostym bocznym a środkowym stawu kolanowego. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć skośnie w kierunku do tyłu i w górę na głębokość 1,5–2 cun. | Drzenie mięśni wokół stawu kolanowego. | Zapalenie stawu kolanowego, reumatyzm kończyny tylnej, porażenie nerwu udowego, porażenie |

| | | | | | |
|-----|---|---|---|---|--|
| | | | | | nerwu piszczelowego i strzałkowego, zapalenie mięśni i ścięgien. |
| 98 | Yang Ling — „Yangowe Wzgórze” | Za stawem kolanowym, we wgłębieniu na górnym brzegu kłykcia bocznego kości piszczelowej. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć w kierunku do przodu i do wewnątrz na głębokość 2,5–3 cun. | Uniesienie kończyny, drżenie mięśni. | Zapalenie stawu kolanowego, niestrawność, reumatyzm kończyny tylnej. |
| 99 | Feng Long — „Obfite Wzniesienie” | Za stawem kolanowym, we wgłębieniu na tylnodolnym brzegu kłykcia bocznego kości piszczelowej. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadłe na głębokość 2–3 cun. | Uniesienie kończyny, drżenie mięśni podudzia. | Niestrawność, reumatyzm kończyny tylnej, porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego. |
| 100 | Hou San Li — „Tylne Trzy Li” | Okolo 3 cun skośnie w tył i w dół od punktu Lüe Cao, w bruzdzie między mięśniem prostownikiem długim palców a mięśniem prostownikiem bocznym palców, we wgłębieniu poniżej głowy kości strzałkowej. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć prostopadłe na głębokość 1,5–2 cun. | Tak samo jak w punkcie Feng Long. | Niestrawność, zapalenie stawu kolanowego, zapalenie stawu skokowego, porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego. |
| 101 | Jiao Dang — „Skrzyżowanie” | Na tej samej żyły, 2 cun powyżej punktu Shen Tang. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Tak samo jak w punkcie Shen Tang. | (brak danych w oryginale) | Takie same wskazania jak dla punktu Shen Tang. |
| 102 | Shen Tang — „Sala Nerkowa” | Na żyłę odpiszczelowej, okolo 4 cun poniżej środka nasady uda po stronie wewnętrznej. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Małą szeroką igłą wkuć na głębokość 3 fen, powodując krwawienie. | — | Zapalenie stawu biodrowego, zapalenie stawu udowo-kolanowego, zapalenie mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego, zapalenie mięśnia dwugłowego uda, zapalenie jąder, ochwat kopyt, obrzęk kończyny tylnej i obrzęk moszny. |
| 103 | Du Xue | Na tej samej żyły, 2 cun poniżej punktu Shen Tang. Po jednym punkcie w każdej kończynie. | Tak samo jak w punkcie Shen Tang. | (brak danych w oryginale) | Takie same wskazania jak dla punktu Shen Tang. |
| 104 | Qu Shang — „Powyżej Zgięcia” | We wgłębieniu 1 cun powyżej punktu Qu Chi. Po jednym punkcie z każdej strony. | Iglą o zaokrąglonym ostrzu wkuć skośnie w kierunku do wewnątrz i w górę na głębokość 1–1,2 cun. | Uniesienie tej kończyny. | Zapalenie stawu skokowego, porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego. |
| 105 | Qu Chi — „Sadzawka przy Zgięciu” | Na żyłę grzbietową śródstopia, we wgłębieniu na grzbietowej stronie stawu skokowego, lekko przesuniętym na zewnątrz. Po jednym punkcie z każdej strony. | Małą szeroką igłą szybko wkuć na głębokość 2–3 fen, powodując krwawienie. | — | Ostre zapalenie stawu skokowego. |
| 106 | Hou Chan Wan — „Tylne Owinięcie Nadgarstka” (staw pęcinowy kończyny tylnej) | Na górnym brzegu stawu pęcinowego, na żyłach palcowych po stronie wewnętrznej i zewnętrznej. Po jednym punkcie po każdej stronie każdej kończyny. | Tak samo jak w punkcie Qian Chan Wan (kończyna przednia). | — | Skręcenie stawu pęcinowego, zapalenie stawu pęcinowego, ostre zapalenie stawu palcowego, zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie pochewki ścięgniastej. |
| 107 | Lao Tang | Odpowiednik punktu Ming Tang z kończyny przedniej, w tej samej lokalizacji anatomicznej na kończynie tylnej. | Tak samo jak w punkcie Ming Tang (kończyna przednia). | — | Skręcenie stawu pęcinowego, zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie pochewki ścięgniastej. |
| 108 | Hou Jiu | Odpowiednik punktu Qian Jiu z kończyny przedniej, na kończynie tylnej. | Tak samo jak w punkcie Qian Jiu. | Tak samo jak w punkcie Qian Jiu. | Ochwat kopyt, reumatyzm kończyny tylnej, porażenie nerwu piszczelowego i strzałkowego, zapalenie stawu pęcinowego, zapalenie mięśni i ścięgien, zapalenie pochewki ścięgniastej. |
| 109 | Hou Ti Men | Odpowiednik punktu Qian Ti Men z kończyny przedniej, na kończynie tylnej. | Tak samo jak w punkcie Qian Ti Men. | — | Takie same wskazania jak dla punktu Qian Ti Men. |

Uwagi i objaśnienie jednostek

Ostatnie przesłane zdjęcie oryginału, oznaczone numerem strony 19, zawiera dokładnie taką samą treść jak strona ze wskazaniem punktów 37 (Jian Jing) do 42 (Lun Feng) — dotyczącymi barku i ramienia kończyny przedniej. Nie zawiera żadnych nowych punktów; jest to powtórzenie wcześniej przetłumaczonej treści. Numeracja punktów kończy się na 109.

- **Cun i fen** — tradycyjne chińskie jednostki miary akupunkturowej. 1 cun = 10 fen. Nie są to sztywne miary metryczne — wyznacza się je proporcjonalnie do budowy ciała danego zwierzęcia (tzw. metoda proporcjonalna), dlatego głębokość wkłucia należy zawsze dostosować do wielkości konkretnego konia.
- **Igła o zaokrąglonym ostrzu** — okrągła, gładka igła akupunkturowa bez ostrej krawędzi tnącej, stosowana do standardowego nakłuwania.
- **Igła trójkątna** — igła o przekroju trójkątnym, używana do nakłuć powodujących kontrolowane krwawienie (upuszczanie krwi).
- **Igła ogniowa** — igła rozgrzewana w ogniu przed nakłuciem, stosowana w wybranych punktach.
- **Mała / średnia / duża szeroka igła** — igły o różnej szerokości ostrza, używane głównie do nakłuć naczyń krwionośnych (upuszczanie krwi).
- **Moksoterapia** — przypalanie punktu za pomocą tłącego się ziela piołunu (moksy).
- **Elektroakupunktura** — stymulacja igieł akupunkturowych prądem elektrycznym o niskim natężeniu.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem karty dydaktycznej dołączonej do modelu anatomicznego i ma charakter poglądowo-edukacyjny. Wszelkie rzeczywiste zabiegi akupunktury weterynaryjnej powinny być wykonywane wyłącznie przez uprawnionego lekarza weterynarii lub certyfikowanego terapeutę.

Sto lat, Kamila – Marta i Mateusz